

Legenda

- Limiti del Parco Alta Murgia
- Limiti amministrativi
- Edificato
- Confini comunali
- Limite dell'area di studio

TIPI DI VEGETAZIONE

VEGETAZIONE RUPESTRE

- Vegetazione delle rupi calcaree mediterranee (Berardo-Casavecchia-Adamantemum siculi Terzi et Tuxen 1943)

VEGETAZIONE IGROFILA

- Stagni temporanei mediterranei (Isotto-Nanquinetta Br.-Bl. et Tuxen 1943)
- Vegetazione igrofita (Lemmon minori Tuxen 1955 ex O. Bolos et Masciari 1955)

PRATERIE ARIDE MEDITERRANEE

- Praterie a *Stipa austrotalica* ssp. *austrotalica* (Acino suaveolens-Stipetum austrotalicae Forst. Perrino et Terzi, 2005)
- Praterie a *Stipa austrotalica* ssp. *austrotalica* in mosaico con garghe ad *Euphorbia spissa* (Casto-Micromerentalia Oberdorfer 1954)
- Praterie a *Stipa austrotalica* ssp. *austrotalica* in mosaico con lande ad *Urginea maritima* ed *Asphodelus microcarpus* (Lygeo-Stipetea Rivas-Martinez 1978)
- Praterie a *Stipa bromoides* e *Carex halimifera* (Scorzoneratalia villosae Horvatic 1975) in mosaico con lande ad *Urginea maritima* ed *Asphodelus microcarpus* (Lygeo-Stipetea Rivas-Martinez 1978)
- Praterie a *Stipa bromoides* e *Carex halimifera* (Scorzoneratalia villosae Horvatic 1975) in mosaico con vegetazione carnifera e nanofanerofita della *Rhamnus cathartica-Prunetea spinosae*
- Praterie alterate a *Stipa bromoides* e *Carex halimifera* (Scorzoneratalia villosae Horvatic 1975)
- Praterie alterate a *Stipa bromoides* e *Carex halimifera* (Scorzoneratalia villosae Horvatic 1975) in mosaico con lande ad *Urginea maritima* ed *Asphodelus microcarpus* (Lygeo-Stipetea Rivas-Martinez 1978)
- Lande ad *Urginea maritima* ed *Asphodelus microcarpus* (Lygeo-Stipetea Rivas-Martinez 1978)
- Praterie post-culturali (Onopordon illyrici Oberdorfer 1954)

ARBUSTI E MANTELLI DI VEGETAZIONE

- Cespugli, arbusti e vegetazione arboreo-arbustiva in evoluzione (*Rhamnus cathartica-Prunetea spinosae* Riv.-Cod. et Bolos et Tuxen 1962)

BOSCHI TERMOFILI DI LATIFOLIE DECIDUE E SEMIDECIDUE

- Boschi di roverella (*Stipa bromoides-Quercetum dalechampii* Bondi, Casavecchia, Guerra, Medagli, Beccarisi, Zuccarelli, 2004)
- Boschi di fragno (*Euphorbia apii-Quercetum trojanae* Bianco, Brullo, Minissale, Signorile et Spampinato 1998)

BOSCHI DI SCLEROFILLE SEMPREVERDI

- Boschi di quercia della Palestina (*Hedera helix-Quercetum calliprioni* Bondi, Casavecchia, Guerra, Medagli, Beccarisi, Zuccarelli, 2004)


BOSCHI DI ORIGINE ANTROPICA

- Rimboscimenti di conifere

AREE PERCORSE DA INCENDI

CLASSI DI USO DEL SUOLO (2° LIV. CORINE LAND COVER)

- 1.1 - Zone urbanizzate
- 1.2 - Insediamenti produttivi, commerciali, dei servizi pubblici e privati, delle reti e delle aree infrastrutturali
- 1.3 - Aree estrattive, cantieri, discariche e terreni artfatti
- 1.4 - Aree verdi artificiali non agricole
- 2.1 - Seminati
- 2.2 - Colture permanenti
- 2.3 - Prati stabili (foraggiere permanenti)
- 2.4 - Zone agricole eterogenee
- 5.1 - Corsi d'acqua, canali e strovie



Coordinatore Scientifico: Arch. Giovanni CAPERO Responsabile AT: Dott. For. Paolo RIGNO

CARTA DELLA VEGETAZIONE					
DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO	FORMATO: 1500x900	CODICE:	
GC	PR	PR	SICOLA: 125.000		
GC	PR	PR	DATA: FEB. 2010	DIS.	7d